

# **ПАМЯТКА**

## **для населения Ростовской области по профилактике гриппа птиц**

Грипп птиц – острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Относится к особо опасным болезням, способным причинить большой экономический ущерб. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего лесные утки. А также источником заражения являются больные птицы, выделяющие вирус с истечениями из носа и рта, экскрементами, яйцом, а также перенесшие инфекцию (срок вирусоносительства 2 месяца).

**Симптомы и течение.** Инкубационный период от 20-30 часов до 2 недель. Болезнь проявляется резким снижением яйценоскости, поедания корма, жаждой, блеанием. У больной птицы отмечаются необычное поведение, дискоординированность движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители, перья взъерошены, незадолго перед гибелю – птицы хрипят, учащённое, температура тела 43-44 °С. Наблюдают также диарею, помет окрашен в коричнево-зелёный цвет, неврозы, судороги, манежные движения.

**Лечение.** Лечение не проводится. Ввиду опасности распространения вируса большую птицу уничтожают.

### **Рекомендации по профилактике гриппа птиц в благополучных районах.**

В связи с отсутствием лечения, основным методом профилактики является вакцинация и ревакцинация птицы в личных подсобных хозяйствах, включая в обязательный порядок поступление молодняка. Вместе с тем необходимо содержать домашнюю птицу в условиях, исключающих её контакт с дикой или сиротливой птицей (безвыгульное содержание). Корма необходимо хранить в закрытых помещениях.

Завоз новой птицы необходимо осуществлять только из благополучных по гриппу птиц областей и районов. Поступившую птицу в течение не менее 10 дней следует содержать изолированно, в этот период необходимо внимательно наблюдать за её состоянием. При проявлении признаков болезни, при обнаружении мертвых птиц нужно незамедлительно сообщить в ветеринарную службу.

Необходимо соблюдать правила личной гигиены. Уход за птицей следует осуществлять только в специальной одежде и обуви, которую необходимо регулярно стирать и чистить.

Выделения зараженной птицы, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека через кожу при пульте и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем через грязные руки. Если после контакта с птицей у вас возникло какое-либо острое респираторное (гриппоподобное) заболевание, нужно срочно обратиться к врачу.

Если наряду с клиническими признаками заболевания незамедлительно сообщать в ветеринарные поликлиники государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом» по месту жительства.