

Африканская чума свиней (африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери) - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, синюшностью кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах и летальностью до 100 % поголовья свиней. Возбудителем заболевания является вирус, который отличается большой устойчивостью и вирулентностью, т.е. способностью вызывать болезнь. Во внешней среде, продуктах убоя больных свиней или почве он может сохраняться до 6 месяцев.

В естественных условиях к заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Переносчиками вируса могут быть кровососущие насекомые, хищные птицы, звери. Естественное заражение происходит при контакте здоровых свиней с больными и вирусоносителями. Так же инфекция распространяется через корма, пастбища, транспортные средства и другие предметы, загрязнённые выделениями больных животных. Одними из переносчиков и распространителей вируса являются дикие кабаны, осуществляющие миграции с одной территории на другую. Инкубационный период 2-5 дней, по некоторым источникам до 15-20 дней. Заболевание протекает молниеносно, остро и хронически. В первом случае животные гибнут внезапно, без характерных клинических признаков; во втором у них повышается температура до 42,5 °С, развивается одышка, кашель, пропадает аппетит, наступает рвота, возникают параличи, наблюдается понос с кровью, посинение кожи на ушах и пяточке, животное резко слабеет и погибает. Лечение свиней при данном заболевании не разработано.

*Ввиду того, что средств иммунопрофилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, в случае появления очага инфекции, бескровным методом уничтожается всё свинополовье в очаге, трупы сжигаются. Эти меры являются крайне необходимыми для локализации очага АЧС и недопущения распространения на соседние территории, причем, чем быстрее произойдет отчуждение и уничтожение всех свиней в очаге, тем меньше вероятность проявления заболевания в клинически выраженной форме. Таким образом владельцы свиней в эпизоотическом очаге не должны препятствовать отчуждению животных, поскольку это значительно затягивает время локализации и ликвидации очага болезни, что ведет к ее дальнейшему распространению. Кроме того, граждане, препятствующие проведению мероприятий или скрывающие факты заболевания или падежа свиней, привлекаются к ответственности.*

В благополучных по АЧС районах владельцам личных подсобных хозяйств, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь:

- предоставлять поголовье свиней для проводимых госветслужбой вакцинаций (против классической чумы, рожи);
- содержать поголовье только закрытым (в свинарниках, сараях) способом;
- не допускать свободного выгула свиней на территории населённых пунктов, особенно в лесной зоне;
- под контролем госветслужбы обрабатывать животных и помещения для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох);
- постоянно вести борьбу с грызунами;
- не использовать корма, пищевые отходы и боенские отходы в рационе свиней без термической обработки;
- запрещено покупать свиней в хозяйствах и у населения без ветеринарных сопроводительных документов, свидетельствующих об эпизоотическом благополучии местности выхода животных, проведении профилактических вакцинаций и клинического ветеринарного осмотра.
- продукты свиноводства (мясо, сало и др.) разрешено реализовывать и покупать только в специально отведенных местах, при этом они обязательно должны быть подвергнуты ветеринарно-санитарной экспертизе и определено их происхождение;
- категорически запрещается реализация продуктов убоя свиней в несанкционированных местах торговли, в домашних условиях.

