

# ПАМЯТКА

## для населения Ростовской области по профилактике африканской чумы свиней

Африканская чума свиней – острое вирусное инфекционное заболевание домашних и диких свиней. Человек африканской чумой свиней не болеет. Вирус африканской чумы свиней обладает высокой устойчивостью во внешней среде (до 2-х лет), долгое время сохраняет активность в условиях холода и высушенном состоянии.

В сырье и продуктах, полученных от больных животных, вирус остается жизнеспособным от нескольких суток до месяца и более. Специфической профилактики (вакцины) против африканской чумы нет.

**Характерные признаки болезни у свиней** – высокая температура тела, снижение аппетита, учащение пульса и дыхания, слабость конечностей, иногда кашель, посинение кожи головы, туловища. Болезнь длится до 2 недель и заканчивается гибелью большинства заболевших животных (от 97 до 100%).

**Источник инфекции** – больные африканской чумой свиней животные, продукты убоя, корма от больных животных. Механическим переносчиком могут быть грызуны, птицы, насекомые.

### **Заражение африканской чумой свиней происходит:**

- при контакте с больными домашними и дикими свиньями;
- через инфицированные факторы внешней среды: вода, подстилка, корма, навоз, одежда и обувь обслуживающего персонала, предметы ухода за животными, оборудование, автотранспорт, инфицированные вирусом мелкие частицы кормов, подстилки, почвы могут переноситься ветром на расстояние нескольких километров;
- при переработке инфицированного сырья животного происхождения (мясо, субпродукты, шкура, щетина, копыта).

### **Меры профилактики заболевания свиней африканской чумой:**

- соблюдение мер строгой изоляции при содержании животных на фермах, подворьях граждан;
- исключить бродяжничество животных, принадлежащих гражданам, исключить контакт с животными других населенных пунктов;
- регулярная обработка свиней против кровососущих насекомых, клещей;
- любое перемещение животных проводить только по согласованию с госветслужбой;
- не допускается торговля мясом и мясопродуктами в неустановленных для этой цели местах.

При подозрении на заболевание свиней африканской чумой необходимо сообщить об этом представителю государственной ветеринарной службы и обеспечить изоляцию животных. При уходе за животными необходимо строго соблюдать правила личной гигиены, использовать спецодежду, спецобувь. По окончании работы спецодежда подлежит обеззараживанию путем дезинфекции в 3-5% растворе кальцинированной соды, с последующей стиркой. Обувь дезинфицируется в 2% растворе едкого натра. Для дезинфекции рук применяют 0,5% раствор хлорамина.

При обнаружении клинических признаков заболевания незамедлительно сообщать в филиалы государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противозпизоотическим отрядом" по месту жительства.